



## Tekli antiplatelet kullanan hastalarda üst gis endoskopik biyopsinin kanamaya etkisi

**Hilmi Bozkurt<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Sbü, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi, İstanbul**

**Amaç :** Japon Gastroenterolojik Endoskopi Derneği, Temmuz 2012'de antitrombotik tedavi gören hastalarda gastroenterolojik endoskopi hakkındaki kılavuzlarını güncelledi. Bu çalışmanın amacı Aspirin kullananlarda üst gastrointestinal endoskopik biyopsinin güvenilirliğini değerlendirmektir.

**Yöntem :** Bu çalışmada temmuz 2018 ve temmuz 2019 tarihleri arasında tek merkez endoskopi ünitesinde yapılan özefagogastroduodenoskopi (EGD) ve biyopsileri prospektif gözlemsel olarak incelendi. Çalışmaya kardiyovasküler ve nörolojik nedenlerden dolayı aspirin 100 mg kullanan ve tanısal amaçlı endoskopik mukozal biyopsi işlemi yapılan hastalar dahil edildi.

**Bulgular :** Endoskopik biyopsi yapılan 111 hasta ile çalışma tamamlandı. Bu hastalardan toplam 214 biyopsi alındı. İlaç kullanım altında ve ilacı kesen olmak üzere iki grupta incelendi. İki grup arasında kanama açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

**Sonuç :** Sonuç olarak bu prospektif gözlemsel çalışma; aspirin tedavisi kesilmeksizin yapılan endoskopik biyopsi işleminin kanama riskini arttırmadığını gösterdi.

**Anahtar Kelimeler:** Antitrombotik tedavi, endoskopik biyopsi, kanama