



Rektum Kanseri Nedeniyle Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Anastomoz Kaçağında Endosponge Tedavisinin etkinliği: Klinik Sonuçlarımız

Selçuk Kaya¹,

¹*Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul*

Amaç : Rektal cerrahiden sonra anastomoz kaçağı %9 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde rektum kanseri nedeniyle low ya da very low anterior rezeksiyon uygulanan hastalarda anastomoz kaçağı sonrası endosponge tedavisinin etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem : Ocak 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında rektum kanseri cerrahisi sonrası semptomatik anastomoz kaçağı nedeniyle endosponge uygulanan tüm hastalar çalışmaya alındı. Birincil sonuç başarı oranı apse boşluğunun tamamen kapanması. İkincil sonuç stoma kapanma oranları idi.

Bulgular : Toplam 7 hastaya endosponge uygulandı. Hastaların hepsi erkekti, yaş ortalaması 56 (42-72) idi. Hastaların tamamı neoadjuvan tedavi almış ve koruyucu ileostomileri olan hastalardı. Ortalama takip süresi 10 ay (6-18) idi. Primer cerrahiden sonra ilk endosponge uygulanması arasındaki ortalama süre 5 gün (4-7) idi. Ortanca endosponge değişim sayısı 6 (4-10) idi. Endosponge uygulanmasındaki başarı oranı %85 ve gastrointestinal devamlılık oranı %71 idi.

Sonuç : Endosponge uygulaması, presakral boşlukların kapatılmasında yüksek başarı oranına sahip olduğu gibi %71 oranında gastrointestinal devamlılığı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, endosponge, rektum kanseri