



# 4. ÇUKUROVA GASTRO - İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLARI

Mide Hastalıkları  
Kolon ve Rektum Hastalıkları  
Proktolojik Hastalıklar  
Gastro - İntestinal Cerrahide Klinik Nutrisyon

*Kongresi*

28 ŞUBAT - 1 MART 2020

HILTONSA OTEL - ADANA

## Perianal fistülde LİFT uygulaması

**Uğur Topal, İsmail Cem Eray, Ahmet Rencüzoğulları**

**Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi AD.**

Perianal fistül, sıklıkla 30-50 yaş arası erkeklerde görülen, kompleks ya da Crohn Hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları ile ilişkili olduğu zaman tedavisi güç olan bir cerrahi hastalıktır. Özellikle anal sfinkter fonksiyonlarının korunması zorunluluğu, kompleks fistüllerde nüks oranlarının yüksek olmasına yol açmakta, cerrahları yeni tedavi yöntemleri arayışına sürüklemektedir LIFT (ligation of intersphincteric fistula tract): İntersfinkterik oluğun diseke edilerek fistül traktının ortaya konması ve fistül traktının bölünerek bağlanması esasına dayanır. Son yapılan meta-analizlerde başarı oranı %71-81 arasında verilmekte, minör inkontinens oranı ise %6'dan az bildirilmektedir . Bu çalışmada kliniğimizde lift uyguladığımız hastaların sonuçlarını ve operasyon görüntülerini sunmayı amaçladık.